

ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ ТУБЕРКУЛЁЗА

Как правило, малые формы туберкулеза протекают бессимптомно и выявляются при профилактических флюорографических осмотрах. При распространенных формах туберкулеза симптомы следующие: слабость, недомогание, одышка, кашель, потеря веса, боли в грудной клетке, температура. С течением времени кашель может перейти в кровохарканье.

Перечисленные симптомы не всегда выражены в тяжёлой форме, но носят постоянный характер, поэтому рекомендуется обратиться к врачу противотуберкулезного диспансера как можно скорее?

Если диагноз туберкулеза подтверждается, больного нужно незамедлительно (в течение 3-5 дней) поместить в диспансер, где ему необходимо пройти полный курс лечения, не пропуская ни одной процедуры, даже если жалобы и недомогание исчезают через несколько недель после начала лечения.

В случае несвоевременного прекращения лечения туберкулез может перейти в устойчивую к антибиотикам форму, которую будет очень трудно вылечить.

*г. Тобольск,
ул. Красноармейская, 6/6,
тел.: 8(3456) 24-69-33.*

Помоги себе остаться здоровым



*ГБУЗ ТО Тобольский филиал
“Областной
противотуберкулезный
диспансер”*